

# 妇产科护理工作中常见安全隐患分析及防范对策探究

陈芳

(崔家坝镇中心卫生院公共卫生科, 湖北 恩施 445000)

**摘要:**目的 结合妇产科护理工作中常见安全隐患进行分析,探究有关的防范对策。方法 回顾我院从2016年4月到2017年7月的产妇50例为研究对象,将常见的安全隐患以统计学形式整合,并通过临床的沟通询问与科学的数据分析,了解产妇在护理干预前后的依从度、心理状态等,并收集产妇的意见,为护理的满意程度进行评分,结合临床的护理效果与产妇的反馈结论,评价常见安全隐患的防范有效性。结果 护理干预后,产妇的依从度极大的提高,且心理逐渐舒缓,放松心态并认可医疗水平,护理后的安全意识增强,隐患的发生几率小,总体对临床的护理评价较为积极,产妇在接受护理前后的情况对比具有统计学意义( $P<0.05$ )。结论 妇产科的患者本身情绪较为激动,身体抵抗力较弱,诸多的孕妇禁忌不够明确,常因为药物原因、自身的认知原因等会埋藏潜在的安全隐患,护理工作中结合常见的安全问题,针对性的提出防范措施,能够提前规避风险,提高妇产科的安全工作效率。

**关键词:**妇产科护理;常见安全隐患分析;防范对策

中图分类号:R246.3

文献标识码:B

DOI:10.19613/j.cnki.1671-3141.2018.97.196

本文引用格式:陈芳.妇产科护理工作中常见安全隐患分析及防范对策探究[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(97):261.

## 0 引言

据研究表明,孕妇在生产时的痛感达到十级,针对妇产科的护理不仅关系到孕妇的健康与安全,同时还牵系着家庭的希望,因此妇产科也是在护理上产生纠纷较多的科室,此时家属的情绪难免有些激动与紧张,护理上通过全方位的干预,结合在妇产科安全护理中的经验,提炼出安全防护的要素,能够强化妇产科的护理有效性,也可以避免不必要的医疗争端,促使产妇顺利生产,幸福回家<sup>[1]</sup>。

## 1 资料与方法

**1.1 一般资料。**回顾我院从2016年4月到2017年7月的产妇50例为研究对象,其中产妇的年龄为23-45岁,平均(27.14±3.26)岁,患者的文化水平方面,大专以下学历26例,大专及以上学历24例,患者的年龄、生产次数与学历等常规信息无统计学差异( $P>0.05$ ),具有可比性。

### 1.2 方法

**1.2.1 依从护理干预:**产妇在孕产期心中难免存在焦虑心理,加之生理上的转变,容易出现应激反应,一些产妇在孕产期的情绪较为暴躁,情绪的浮动较大,护理中应及时的与产妇沟通,使其尽可能抱有美好的幻想,可思考未来与宝宝共同生活的场景,逐渐的以心理的满足排除杂念,同时要家属做好沟通,顺应产妇的想法,使得产妇抱有良好的心态接受手术,缓解产妇的压力。

**1.2.2 护理知识干预:**产妇在孕产期虽然存在一定的安全意识,但缺乏科学的自我安全理解,护理人员可将孕产期饮食、运动、作息等不同层次的注意事项列举出来,结合产妇怀孕的时间与即将临盆的期限,做好专业的培训,使得产妇能够进行自主的护理,为安全生产做好保障。

**1.2.3 药物安全干预:**产妇用药上有诸多禁忌,一旦在用药上出现过量或者给药错误,将会造成不可估计的危险,护理人员应充分的了解药物的有关属性,把控好药量,结合产妇的情况给药,在医师的嘱咐下灵活的调控给药,避免风险的发生<sup>[2]</sup>。

**1.3 观察指标。**将常见的安全隐患以统计学形式整合,并通过临床的沟通询问与科学的数据分析,了解产妇在护理干预前后的依从度、心理状态等,并收集产妇的意见,

为护理的满意程度进行评分,总体满意率以满意与较满意的总和计算。

**1.4 统计学分析。**本次研究采用SPSS 20.0软件进行分析,以百分比%与均值±统计数据,计数资料以 $t$ 检验,产妇在接受护理前后的情况对比具有统计学意义( $P<0.05$ )。

## 2 结果

**2.1 经过护理干预,**产妇的依从度提高,心理趋向健康发展,总体的护理质量得到优化,详见表1。

表1 护理前后产妇的安全情况对比( $\bar{x} \pm s$ )

时间	<i>n</i>	依从度	心理健康	总体质量
护理前	50	27.12±3.24	15.24±3.51	79.35±5.61
护理后	50	12.34±2.57	26.34±5.24	95.52±2.67
<i>t</i>	-	10.24	110.35	9.34
<i>P</i>	-	< 0.05	< 0.05	< 0.05

**2.2 护理后产妇的反馈满意率提高,**护理前的满意率为88%,护理后的满意率提高到96%,详见表2。

表2 护理前后产妇反馈的满意度对比

时间	<i>n</i>	满意	较满意	不满意
护理前	50	32	12	6
护理后	50	34	14	2
<i>t</i>	-	5.24	7.25	10.37
<i>P</i>	-	< 0.05	< 0.05	< 0.05

## 3 结论

妇产科的护理工作较为繁杂,应结合产妇的个体情况,总结护理中的常见危险因素,分析潜在的危险隐患,并加以科学的安全预防,强化产妇的临床依从度,提高其心理认知水平,使得妇产科护理工作顺利推进<sup>[3]</sup>。

## 参考文献

- [1] 潘晓冬.探讨临床妇产科护理工作中常见隐患及防范措施[J].家庭心理医生,2014(2):309.
- [2] 勾显跃.妇产科护理工作中常见安全隐患分析及防范对策探究[J].医药,2016(8):74.
- [3] 徐秀娟.探析妇产科护理工作中的安全隐患及对其进行防范的措施[J].当代医药论丛,2014(12):148.